



Carbonero común (*Parus major*)



Descripción: Tiene la cabeza de color negro con los auriculares blancos. El vientre de color amarillo y dividido por una mancha negra, más marcada en los machos. El dorso es de color verdoso y con las alas de color grisáceo. Los jóvenes son de un color más apagado.

Hábitat: Bosques mixtos, de coníferas, bosques de ribera, frutales y parques.

Alimentación: Durante la primavera y el verano se alimenta de insectos. Durante el otoño y el invierno se alimenta de semillas de diferentes árboles.

Reproducción: Para atraer a las hembras y defender el territorio, los machos cantan situados en la parte superior de los árboles. Nidifica en agujeros de árboles. És uno de los inquilinos más habituales de las cajas nido. El nido es una taza de musgo recubierta de plumas y materiales blandos, que construye la hembra. Los huevos son blancos com manchas rojizas, y de aproximadamente 18 mm. Cada puesta puede ser de entre 4 y 12 huevos, dependiendo de la disponibilidad de alimento, de la edad de la hembra y de las dimensiones del nido. Puede tener una segunda puesta. La hembra es la encargada de la incubación que dura entre 13 y 16 días. Los pollos se quedan en el nido durante unos 16 a 20 días.

Orificio de entrada de la caja nido: 30 mm