



Raspinell comú (*Certhia brachydactyla*)



© Geden

Descripció: En la part superior presenta un color marró fosc imitant els troncs dels arbres, i les parts inferiors són d'un color més cru. Presenta una petita cella poc definida, i té el bec llarg i corbat. S'enfila tronc amunt dibuixant una espiral, amb l'ajut de les fortes potes i plomes de la cua. És difícil de confondre amb altres ocells, excepte amb el raspinell pirinenc, no observat a la zona, però que en hiverns molt freds podria presentar-s'hi. Els dos sexes són iguals.

Hàbitat: Boscos mixtes, i també se'l pot observar en boscos de ribera.

Alimentació: S'enfila pels arbres buscant tota classe d'insectes i larves entre l'escorça, ajudat pel seu llarg i corbat bec. A l'hivern també poden consumir llavors d'algunes plantes.

Reproducció: Nidifica en forats i esquerdes dels arbres. Els nius estan fets amb petites branques formant un petit forat en el qual posen molsa i plomes. En la construcció del niu hi participen tant el mascle com la femella. Els ous són blancs amb taques vermelles i d'aproximadament 16 mm. Cada posta és de 4 a 7 ous, i generalment pot tenir una segona posta. La incubació la realitza la femella i dura de 13 o 15 dies. Els pollets es queden al niu de 14 a 18 dies.

Orifici d'entrada de la caixa niu: 70x30mm. La caixa es col·locarà adossada al tronc i el forat d'entrada estarà situat al lateral de la caixa a prop del tronc.